

## UWAGA – CUKRZYCA

### OBJAWY HIPOGLIKEMII (ZA NISKIEGO POZIOMU CUKRU WE KRWI):



- osłabienie
- nudności (mlaskanie, ślinotok), wymioty
- niepokój
- drgawki
- senność
- śpiączka

### POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA HIPOGLIKEMII:

- wetrzeć niewielką ilość miodu w błony śluzowe – w dziąsła lub pod język
- JEŚLI ZWIERZĘ JEST PRZYTOMNE podać do picia wodę z cukrem
- natychmiast udać się do lekarza weterynarii.

### OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KOTEM CUKRZYCOWYM:

1. Insulinę podajemy 2 x dziennie. ZAWSZE o stałej porze.
2. Zwierzę ma mieć stały dostęp do karmy. Powinna to być specjalna karma dla cukrzyka.
3. W razie wystąpienia objawów hipoglikemii postępujemy jak napisano powyżej. Jeśli zwierzę nie odzyskuje świadomości NATYCHMIAST udajemy się do lecznicy weterynaryjnej. Jeśli zwierzę odzyska świadomość podajemy posiłek i NATYCHMIAST informujemy telefonicznie lekarza prowadzącego o zaistniałym incydencie.
4. Pena z insuliną nie wstrząsamy.
5. Szczyt działania insuliny to 4-6h od momentu jej podania. W pierwszych dniach leczenia oraz po każdej zmianie dawki jest to czas w którym należy obserwować zwierzę.

Ustalenie docelowej dawki insuliny może zająć kilka tygodni, wymaga stałego kontaktu z lekarzem weterynarii, kontrolnych pomiarów glukozy i nie może być prowadzone na własną rękę. Jeśli decydujemy się na wprowadzenie terapii insuliną nie możemy jej po prostu przerwać w dowolnym momencie.

1. Każdorazowo słabszy apetyt lub zjedzenie zbyt małej dawki pokarmu może spowodować, że po podaniu insuliny cukier będzie za NISKI. Stąd KAŻDY epizod osłabionego apetytu wymaga kontaktu z lekarzem. Podobnie jest w przypadku wymiotów.
2. Zalecane jest by właściciel zwierzęcia z cukrzyca nauczył się oznaczać poziom cukry we krwi w warunkach domowych.
3. Zwierzę-cukrzyk wymaga regularnych kontroli w gabinecie weterynaryjnym. Krzywą cukrową wykonujemy co 3 miesiące.